INSTRUKCJA UŻYCIA

Forlax®Kids – 200 g

Macrogolum 4000

Proszek do sporządzania roztworu doustnego

Opakowanie zawiera miarkę.

Przed użyciem tego wyrobu medycznego należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem wyrobu medycznego, ponieważ zawiera ona ważne informacje.

1. Co to jest wyrób medyczny Forlax®Kids i w jakim celu się go stosuje

Wskazania

Wyrób medyczny Forlax®Kids jest przeznaczony do stosowania w objawowym leczeniu zaparć.

Wspomaga perystaltykę, ułatwiając prawidłowe wypróżnienia, co przeciwdziała zaparciom i zapobiega powstawaniu zalegania kału.

Skład

Makrogol 4000, sukraloza, aromat pomarańczowy.

Sposób działania

Makrogol 4000 jest obojętnym, rozpuszczalnym w wodzie polimerem o dużej masie cząsteczkowej, który ma zdolność wiązania się z wodą w jelicie, zatrzymując ją w kale, przez co:

- decyduje o nawodnieniu i zmiękczeniu masy kałowej oraz ułatwia jej wydalenie;
- przyspiesza pasaż jelitowy poprzez wspomaganie perystaltyki.

Makrogol 4000 nie jest wchłaniany ani metabolizowany w przewodzie pokarmowym i nie prowadzi do zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej, jeśli jest przyjmowany ze wskazaną dawką płynu.

Wyrób medyczny Forlax®Kids działa w ciągu 24-72 godzin.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Forlax®Kids

KIEDY NIE STOSOWAĆ FORLAX®KIDS:

- w przypadku uczulenia na makrogol lub którykolwiek z pozostałych składników tego wyrobu;
- w przypadku niedrożności porażennej jelit;
- w przypadku perforacji, niedrożności lub zwężenia jelit;
- w przypadku ciężkich zapalnych chorób jelit (np. wrzodziejące zapalenie jelita grubego; choroba Leśniowskiego-Crohna, toksyczny megakolon);

Stosowanie środków przeczyszczających jest przeciwwskazane w przypadku ostrego bólu brzucha lub bólu o nieznanym pochodzeniu, nudności i wymiotów, krwawienia z odbytu o nieznanym pochodzeniu oraz w przypadku ciężkiego odwodnienia.

Ostrzeżenia

Zaleca się stosowanie produktu u dzieci po konsultacji z lekarzem.
Podawanie produktu dzieciom powinno odbywać się pod bezpośrednim nadzorem dorosłego.

Należy skonsultować się z lekarzem przed użyciem wyrobu w czasie ciąży i karmienia piersią.

Nie stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu. Nie stosować, jeśli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone. Produkt może skrócić czas przebywania w jelicie, a tym samym

wchłanianie doustnych leków. Dlatego zaleca się skonsultowanie się z lekarzem, jeśli przyjmujesz jednocześnie doustne leki, które w każdym przypadku muszą być przyjmowane w odstępie co najmniej 2 godzin. Wyrób medyczny ForlaxKids® może powodować potencjalne interakcje w przypadku stosowania z substancjami zgęszczającymi do żywności na bazie skrobi.. Makrogol przeciwdziała zagęszczającemu działaniu skrobi, upłynniając preparaty, które powinny pozostać gęste, aby umożliwić ich spożycie przez osoby z problemami z połykaniem. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.

3. Jak stosować Forlax®Kids

Sposób podawania:
Należy użyć miarki znajdującej się w opakowaniu, aby odmierzyć proszek. Miarkę należy napełnić równo, nie ugniatając, a następnie usunąć nadmiar produktu np. ostrzem noża.
Rozpuścić proszek w wodzie lub innym płynie (50 ml na każdą miarkę) i spożyć natychmiast.

Zalecane dawkowanie:

Dawkę należy zwiększyć lub zmniejszyć w zależności od indywidualnej odpowiedzi na leczenie, aby umożliwić regularne wypróżnienia miękkiego stolca. Jeżeli zaparcie utrzymuje się dłużej niż 7 dni, należy zgłosić się do lekarza.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12. r.ż.

2 do 10 płaskich miarek dziennie.

Maksymalna wymagana dawka zazwyczaj nie przekracza 10 miarek dziennie.

Zaleca się przyjmowanie produktu rano, jeśli stosowana jest minimalna dawka (2 miarki dziennie). W przypadku większych dawek podzielić spożycie na rano i wieczór.

Dzieci w wieku od 6. miesiąca do 12. r.ż.

- 6–10 kg: 1 płaska miarka dziennie
- 10–15 kg: 1–2 płaskie miarki dziennie
- 16–20 kg: 2–3 płaskie miarki dziennie
- 21–43 kg: 3–4 płaskie miarki dziennie

Maksymalna wymagana dawka zazwyczaj nie przekracza 4 miarek dziennie.

Zaleca się przyjmowanie produktu rano, jeśli stosowana jest minimalna dawka (1 miarka dziennie). W przypadku większych dawek podzielić spożycie na rano i wieczór.

4. Możliwe działania niepożądane

Mogą wystąpić pewne dolegliwości żołądkowo-jelitowe (np. ból żołądka, wzdęcia, uczucie pełności w jamie brzusznej, nudności i nietrzymanie stolca). Biegunka jest działaniem niepożądany występującym podczas przyjmowania zbyt wysokich dawek Forlax®Kids i można jej uniknąć poprzez zmniejszenie dawki.

Po zastosowaniu produktów zawierających makrogol. Rzadko zgłaszano przypadki reakcji nadwrażliwości, nawet ciężkich.

W takich przypadkach należy natychmiast przerwać stosowanie produktu i skontaktować się z lekarzem.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce lub jeżeli którekolwiek z objawów niepożądanych nie ustępuje, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Forlax®Kids

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, chronić przed światłem i źródłami ciepła.
Po użyciu dokładnie zamknąć pojemnik.
Data ważności dotyczy produktu prawidłowo przechowywanego.

6. Inne informacje

Zawartość opakowania:

Słoiczek zawierający 200 g proszku w tekturowym opakowaniu z miarką.



Wytwórca:

Biofarma – Via Castelliere 2 – Mereto di Tomba (UD), Włochy



Dystrybutor:

Mayoly Polska sp. z o.o., ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji: listopad 2024

Wyrób medyczny CE 0373

